

## ESTUDIO DEL RIESGO DE DISEMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A ANTIBIÓTICOS DESDE HECES Y ESTIÉRCOL DE CORDEROS DE RASA ARAGONESA AL SUELO

Alcalá<sup>1\*</sup>, B., García<sup>1</sup>, M.S., González<sup>2,3</sup>, J.M., Lahoz<sup>1</sup>, B., Reinoso-Peláez<sup>4</sup>, E.L., Juan<sup>1</sup>, T., Andrés-Barranco<sup>1</sup>, S., Arenas<sup>3</sup>, J., Jiménez de Bagües<sup>1</sup>, M.P., Mainar-Jaime<sup>3</sup>, R.C., Calvete<sup>1</sup>, C., Marín<sup>1</sup>, C.M. y Calvo<sup>1,5</sup>, J.H.

<sup>1</sup>CITA-IA2. Av. Montañana 930, 50059, Zaragoza, España; <sup>2</sup>Gabinete Técnico Veterinario S.L.U., Barcelona, España; <sup>3</sup>Universidad de Zaragoza-IA2. C. Miguel Servet 177, 50013, Zaragoza, España;

<sup>4</sup>INIA-CSIC. Ctra. de La Coruña km 7,5. 28040 Madrid, España;

<sup>5</sup>ARAID. Av. Ranillas I-D, 50018, Zaragoza, España

\*balcala@cita-aragon.es

### INTRODUCCIÓN

Las bacterias presentes en el estiércol animal pueden ser importantes reservorios de genes de resistencia a los antibióticos (GRA) y de elementos genéticos móviles (EGM) que participan en la transmisión horizontal a otras especies (Aslam *et al.*, 2021). El objetivo de este trabajo fue evaluar el riesgo potencial de transmisión de estos GRA desde las heces y el estiércol al suelo.

### MATERIAL Y MÉTODOS

Se obtuvieron muestras de 2 cebaderos (A y B) de heces animales (n=7), estiércol (n=5), estiércol madurado (n=4) y suelo antes (n=5) y después de ser abonado con estiércol madurado (n=4) del cebadero B. El ADN total se extrajo mediante kits comerciales, a partir de homogenizados de muestras, y se utilizó para realizar la secuenciación del metagenoma mediante nanoporos (MinION, Oxford Nanopore Technologies). La anotación de los genes se realizó mediante la plataforma EPI2ME y el *pipeline* ARMA (*Antibiotic Resistance Mapping Application*) a partir de la base de datos CARD. Los plásmidos y genes que codifican factores de virulencia se identificaron mediante PlasmidFinder y VirulenceFinder respectivamente, dentro de la plataforma Galaxy (<https://usegalaxy.org>). Los EGM se identificaron con el software MobileElementFinder a través de la plataforma del *Center for Genomic Epidemiology* (<https://www.genomicepidemiology.org>). El análisis y visualización de datos se realizó mediante el software ResistoXplorer.

### RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La abundancia relativa de GRA fue similar entre heces y estiércol de ambas explotaciones, así como entre el estiércol madurado y sin madurar y entre los suelos abonados y no abonados. Sin embargo, se encontraron diferencias en el número de copias de GRA por Gb secuenciado entre el estiércol ( $363,09 \pm 174,57$ ) y ambos suelos ( $138,99 \pm 30,12$ ). Esto se reflejó en la diversidad  $\alpha$ . El número de EGM mostró diferencias entre las heces del cebadero A ( $891,6 \pm 207,32$ ) y las del B ( $56,5 \pm 12,02$ ), además de marcadas diferencias en la composición de sus genes. No obstante, no se EGM en el conjunto de suelos ( $1 \pm 1,19$ ). En el total de las muestras, sólo el 1,51% de los GRA se detectaron en plásmidos. Respecto a la presencia de genes de virulencia, no se observaron diferencias significativas en abundancia entre los cebaderos, aunque el análisis de las heces y estiércol de ambas explotaciones sí reveló la abundancia diferencial de 23 genes que para factores de virulencia.

### CONCLUSIÓN

A pesar de que tanto heces como estiércol contienen una gran cantidad de bacterias portadoras de GRA y EGM, su transmisión a la microbiota del suelo parece ser muy limitada. No obstante, en este trabajo detectamos diferencias en cuanto a la composición y número de EGM entre microbiota de heces y estiércol, lo cual podría afectar a la diferente diseminación de los GRA.

### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Aslam, B., Khurshid, M., Arshad, M.I., Muzammil, S., Rasool, M., Yasmeen, N., Shah, T., Chaudhry, T.H., Rasool, M.H., Shahid, A., Xueshan, X., Baloch, Z. 2021. Antibiotic Resistance: One Health One World Outlook. *Frontiers in cellular and infection microbiology* 11: 771510.

**Agradecimientos:** El proyecto GANARAM forma parte del Plan Complementario Agroalnext dentro del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por fondos Europea-Next Generation EU.